

Voici une liste d'éléments déclarés comme étant fréquemment mal interprétés et impliqués dans des accidents graves liés à la médication.

ABRÉVIATIONS

TOUJOURS UTILISER	INTERDIT
Médicaments inscrits au long	Médicaments abrégés (PNC, cyclo, etc.)
Vaccins inscrits au long	Vaccins abrégés
« Oreille droite » ou « Oreille gauche » ou « les deux oreilles »	Ad, As, Au
« Œil droit » ou « œil gauche » ou « les deux yeux »	od, os, ou
« ml » ou « millilitre »	cc
« Cesser » ou « Congé »	D/C
Trois premières lettres du jour ou au complet	L – M – M – J – V – S – D Jour de la semaine
NaCl 0,9%	NS
die	QD
« q 2 jours » ou « Q 2 jours »	QOD
« sous-cutané » ou « sublingual »	SC, SL
« Unité(s) » ou « Unité(s) internationale(s) »	U, UI
« Pour 3 jours »	x3d

SYMBOLES

TOUJOURS UTILISER	INTERDIT
mcg	µg
et	&
à	@
« plus », « et » ou « pos »	+
« moins » ou « nég »	-
« plus ou moins »	±
infini	∞

INSCRIPTIONS NUMÉRIQUES

TOUJOURS UTILISER	INTERDIT
« 1 mg »	Zéro à droite de la virgule Ex : 1,0mg
« 0,5 mg » Écrire un chiffre à gauche de la virgule	Manque un zéro à gauche de la virgule Ex : ,5mg
« Indéral 40 mg » Ajouter deux espaces entre le nom et la dose et un espace entre la dose et l'unité de mesure du médicament.	Manque un espace après le nom du médicament surtout ceux se terminant par « L » Ex : Indéral40mg
Utiliser les espaces pour toutes les doses au-dessus de 1 000 ou utiliser les mots « mille » ou « million ».	Manque les espaces Ex : 100000 Unités
< 10 ou « plus petit que » ou « inférieur à »	Utilisation des signes : <10
≤ 10 ou « égal ou inférieur à »	≤10
> 10 ou « plus grand que » ou « supérieur à »	>10
≥ 10 ou « égal ou supérieur à »	≥10
Utiliser deux espaces si ces signes sont utilisés.	